


Evolution des nappes en Charente de fin janvier à fin décembre 2021




- Les niveaux sont restés en majorité \geq à la moyenne de janvier à octobre, notamment de janvier à mars, et de juin à septembre
- Depuis septembre, l'absence de pluie significative a entraîné une baisse progressive des niveaux jusqu'en fin d'année
- Au 31 décembre 2021, 56% des niveaux sont < moyenne

Situation des nappes en Charente, fin décembre de 2001 à 2021

(% calculés / totalité historique jusqu'en 2020, de chaque piézomètre, en enlevant l'année considérée)

Données source : Région Nouvelle-Aquitaine, traitement ARB-NA




- Au 31 décembre 2021, la situation observée se situe au 9^{ème} rang des années les moins favorables depuis 2001 (classement par niveaux > moyenne)

AUME-COUTURE

AIGRE – nappe du Jurassique supérieur

Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1993 à 2020




- Min 1992 – 2022
- Moyenne interannuelle 1992 – 2022
- Mediane 1992 – 2022
- Quinquennale Seche 1992 – 2022
- Decennale Seche 1992 – 2022
- Max 1992 – 2022
- 2022
- Quinquennale Humide 1992 – 2022
- Decennale Humide 1992 – 2022
- 2021

AUGE

MONTIGNE – nappe du Jurassique supérieur

Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 2001 à 2004&2015-2020




- Min 2000 – 2022
- Moyenne interannuelle 2000 – 2022
- Mediane 2000 – 2022
- Quinquennale Seche 2000 – 2022
- Decennale Seche 2000 – 2022
- Max 2000 – 2022
- 2022
- Quinquennale Humide 2000 – 2022
- Decennale Humide 2000 – 2022
- 2021

BIEF

BELLICOU – nappe du Dogger

Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1995 à 2020




- Min 1995 - 2022
- Moyenne interannuelle 1995 - 2022
- Mediane 1995 - 2022
- Quinquennale Humide 1995 - 2022
- Quinquennale Seche 1995 - 2022
- Decennale Humide 1995 - 2022
- Decennale Seche 1995 - 2022
- Max 1995 - 2022
- 2022
- 2021

ANTENNE et SOLOIRE


BALLANS - nappe du Portlandien

Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1993 à 2020



ROUFFIAC – nappe du Turonien


Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1994 à 2020



- Min 1993 – 2022
- Moyenne interannuelle 1993 – 2022
- Mediane 1993 – 2022
- Quinquennale Humide 1993 – 2022
- Quinquennale Seche 1993 – 2022
- Decennale Humide 1993 – 2022
- Decennale Seche 1993 – 2022
- Max 1993 – 2022
- 2022
- 2021

BONNARDELIERE – nappe libre du Dogger

Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 2002 à 2020




- Min 2002 – 2022
- Moyenne interannuelle 2002 – 2022
- Mediane 2002 – 2022
- Quinquennale Seche 2002 – 2022
- Decennale Seche 2002 – 2022
- Max 2002 – 2022
- 2022
- Quinquennale Humide 2002 – 2022
- Decennale Humide 2002 – 2022
- 2021

NOUERE

LUNESSE – nappe du Portlandien


Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1995 à 2020



- Min 1995 – 2022
- Moyenne interannuelle 1995 – 2022
- Mediane 1995 – 2022
- Quinquennale Seche 1995 – 2022
- Decennale Seche 1995 – 2022
- Max 1995 – 2022
- 2022
- Quinquennale Humide 1995 – 2022
- Decennale Humide 1995 – 2022
- 2021

LAROCHEFOUCAULD– karst de La Rochefoucauld


Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1990 à 2020



- Min 1990 – 2022
- Moyenne interannuelle 1990 – 2022
- Mediane 1990 – 2022
- Quinquennale Seche 1990 – 2022
- Decennale Seche 1990 – 2022
- Alerte renforcée
- Coupure (mi-août/mi-septembre)
- Max 1990 – 2022
- 2022
- Quinquennale Humide 1990 – 2022
- Decennale Humide 1990 – 2022
- Alerte LAROCHEF
- Coupure (mi-juin/mi-août)
- 2021

VOUILLAC1 – nappe libre du Jurassique supérieur


Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1995 à 2020



- Min 1995 - 2022
- Moyenne interannuelle 1995 - 2022
- Mediane 1995 - 2022
- Quinquennale Humide 1995 - 2022
- Quinquennale Seche 1995 - 2022
- Decennale Humide 1995 - 2022
- Decennale Seche 1995 - 2022
- Max 1995 - 2022
- 2022
- 2021

SAUZE – nappe libre du Dogger

Evolution piézométrique en 2021 par rapport aux années antérieures 1990 à 2020



- | | |
|--|---|
| — Min 1990 – 2021 | — Max 1990 – 2021 |
| — Moyenne interannuelle 1990 – 2021 | — 2022 |
| — Mediane 1990 – 2021 | — Quinquennale Humide 1990 – 2021 |
| — Quinquennale Seche 1990 – 2021 | — Decennale Humide 1990 – 2021 |
| — Decennale Seche 1990 – 2021 | — 2020 |